

Aviaire Influenza of vogelgriep : preventie is noodzaak

WAAKZAAMHEID GEBODEN

Een zo snel mogelijke detectie van een mogelijke besmetting is de beste garantie voor een succesvolle bestrijding van de ziekte. Het is dus belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen weer aan te scherpen om een mogelijke insleep in de stallen te voorkomen.

PREVENTIE

Alle bioveiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen om de verspreiding van de besmetting te voorkomen. Een positief bevestigde haard blijft geblokkeerd: de aan- of afvoer van pluimvee is verboden. De stallen, infrastructuur, ruimten, materieel, ... en alle gereedschap, die voor het pluimvee worden gebruikt, dienen te worden gereinigd en ontsmet.



Gebruik hiervoor uiteraard het juiste en volledige reinigings- en ontsmettingsprotocol!

IN DE PRAKTIJK !?



- ① **Gezien de mogelijke verspreiding via lucht en contact met andere dieren en/of mensen is het belangrijk deze vectoren te herkennen en onder controle te houden.**

Preventieve maatregelen die genomen moeten worden:

1. Vermijd insleep van buitenaf: Houd het bedrijf ontoegankelijk voor derden. Zorg voor een propere en vuile weg. Leveranciers en bezoekers dienen de wielen van hun voertuig te ontsmetten alvorens het bedrijf op te rijden. Afrijden gebeurt via de vuile weg!
2. Plaats aan de ingang van elke stal een ontsmettingsbak met een verse oplossing desinfectiemiddel. Vergeet ook niet de laarzen te ontsmetten elke keer de stal betreden wordt. Ontsmettingsbakken hebben pas nut als deze gebruikt worden! Gebruik hiervoor D 50 of VIROCID aan 1% en ververs om de 2 à 3 dagen.
3. Reinig en ontsmet de handen alvorens de stal te betreden. Gebruik een decontaminerende handzeep zoals KENODERM en ontsmet tussendoor met KENOSEPT-G of KENOSEPT-L. Idem voor bezoekers (ook de veearts!).
4. Gebruik aangepaste en propere kledij om de stal te betreden. Laat bezoekers bedrijfseigen kledij dragen. Gebruik per stal of afdeling eventueel andere kledij om verspreiding te voorkomen. Was de stalkledij vaker dan normaal.
5. Houd honden, katten, vogels en ander ongedierte uit de stal! Honden en katten zijn potentiële en gevaarlijke vectoren!
6. Denk preventief en blijf vooral alert! Een fout is snel gebeurd! Indien het bedrijf geruimd moet worden is het te laat!




② **Besmette bedrijven worden aan een grondige reinigings- en ontsmettingsprocedure onderworpen:**

- Alle oppervlakken inschuimen met een krachtig alkalisch en vuiloplossend inweekmiddel. Gebruik hiervoor KENOSAN, dosering 1.5 - 2%. Bij gebruik van de afgebeelde schuimplans, stand 3 instellen. Respecteer 30 minuten inweektijd. Vervolgens grondig naspoelen met water onder hoge druk.
- Na het afspoelen van reinigingsmiddel met alle onzuiverheden, is het van groot belang om de oppervlakken goed te laten opdrogen. Indien er plassen water achterblijven, zal dit de oplossing desinfectiemiddel verdunnen en het resultaat dus nadelig beïnvloeden.
- Voor het ontsmetten van de stallen wordt eveneens aangeraden om dit met behulp van schuimapparatuur te doen. Inschuimen garandeert een beter en langer contact tussen ontsmettingsmiddel en oppervlak, het geeft een zichtbaar resultaat en het veroorzaakt minder nevel in de lucht (ademhalingsbescherming). Dosering: 1%.
Voor een stal van 1000 m² vloeroppervlakte heeft u +/- 7,5 L VIROCID nodig.
Niet naspoelen, het product laten inwerken.
- De stal volledig laten opdrogen. Het desinfectiemateriaal dient eveneens gereinigd en ontsmet te worden alvorens terug op te bergen. Laarzen en laarzen-ontsmettingsbakken reinigen en ontsmetten. Gebruik VIROCID of D 50 aan 1% in een laarzendesinfectiebak.

PRODUCTWIJZER PREVENTIE VOGELGRIEP VIRUS:



KENOSAN
schuimreiniger



VIROCID
ontsmettingsmiddel



D 50
ontsmettingsmiddel



KENODERM
KENOSEPT-G/L



OMNIWASH
waspoeder



SCHUIMLANS
HD 2 L



ONTSMETTINGSBAK CID LINES



RUGSPUIT
wieldesinfectie

VIROCID is bewezen doeltreffend tegen het vogelgriepvirus (*Avian Influenza*) aan 0,25% !

Vraag naar ons advies bij temperaturen onder het vriespunt voor desinfectie van transportmiddelen.

③ Voorschriften opgelegd door de meeste overheidsinstanties in geval van uitbraak met vogelgriep:

1. Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
2. Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst.
3. De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dat verbod geldt niet voor:
 - het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
 - de bedrijfsdierenarts;
 - het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;
 - het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het aviaire influenzavirus te vermijden.

4. Elke verantwoordelijke moet een register van bezoeken bijhouden met vermelding van de datum en het uur van het bezoek, naam en adres van de bezoeker, de nummerplaat van de wagen, de reden van het bezoek alsook het al of niet betreden hebben van de stallen. In het register worden in chronologische volgorde alle personen ingeschreven die de pluimveestal of de broeierij betreden. De bedrijfsdierenarts moet dit register bij elk bezoek dateren en ondertekenen.